

12 Febbraio 2018 - Analisi Esplorativa

Cognome:

Nome:

Matricola:

Tipologia d'esame: 12 CFU 15 CFU

Prova scritta

Si svolgano gli esercizi riportando il risultato dove indicato. Durata: 60 minuti

Esercizio 1 (5 punti)

Sapendo che

- la prima riga di X è pari a $x'_1 = (9, 12, 22)$ e il baricentro è pari a $\bar{x}' = (8.05, 4.1, 13.74)$
- la seconda colonna di V è $v_2 = (0.74, -0.67, -0.08)'$, dove V è la matrice degli autovettori di S
- $s_{11} = 89.9$ e il secondo autovalore di S è $\lambda_2 = 1$

si risponda alle seguenti domande:

- a. Riportare il valore del primo elemento di $y_2 = \tilde{X}v_2$, arrotondando al **secondo decimale** :

dove \tilde{X} è la matrice dei dati centrati

```
xbar = matrix(c(8.05,4.1,13.74), ncol=1)
u1 = matrix(c(9,12,22), nrow=1)
v2 = matrix(c(0.74,-0.67,-0.08), ncol=1)
y12 = (u1-t(xbar)) %*% v2
round(y12, 2)
```

```
##      [,1]
## [1,] -5.25
```

- b. Si calcoli il coefficiente di correlazione tra la prima colonna \tilde{x}_1 di \tilde{X} e i punteggi y_2 della seconda componente principale, arrotondando il calcolo al **secondo decimale**:

$$\text{Corr}(\tilde{x}_1, y_2) = \dots\dots$$

- c. Si calcoli $d_\infty(x_1, \bar{x}) = \dots\dots$

```
# b
s11 = 89.9
lambda2=1
round( v2[1] * sqrt(lambda2) / sqrt(s11) , 2)
```

```
## [1] 0.08
```

```
# c
max(abs(u1-t(xbar)))
```

```
## [1] 8.26
```

Esercizio 2 (9 punti)

Si consideri la seguente matrice di correlazione $R_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0.83 & 0.78 \\ & 1 & 0.67 \\ & & 1 \end{bmatrix}$.

a. Sulla base di R , si consideri il modello fattoriale ad un fattore $x = \underset{p \times 1}{\Lambda} \underset{p \times 1 \times 1}{f} + \underset{p \times 1}{u}$ dove $\Lambda' = (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$.

Nel *metodo di stima naive*, partendo da $R = \Lambda\Lambda' + \Psi$, si ottiene il seguente sistema di equazioni $\hat{\lambda}_1\hat{\lambda}_2 = 0.83, \hat{\lambda}_3\hat{\lambda}_2 = 0.67, \hat{\lambda}_1\hat{\lambda}_3 = 0.78, \hat{\psi}_i = 1 - \hat{\lambda}_i^2, i = 1, 2, 3$. Risolvendo il sistema di equazioni, si ottiene $\hat{\lambda}_1^2 = r_{12}r_{13}/r_{23}$, dove r_{ij} è l'elemento di R in posizione (i, j) . Si riportino, arrotondando al **secondo decimale**:

$$\hat{\lambda}_1 = \dots\dots\dots, \hat{\lambda}_2 = \dots\dots\dots, \hat{\lambda}_3 = \dots\dots\dots, \hat{\psi}_1 = \dots\dots\dots, \hat{\psi}_2 = \dots\dots\dots, \hat{\psi}_3 = \dots\dots\dots$$

b. Il numero di parametri corrispondenti al modello fattoriale ad un fattore (senza vincoli) è pari a

c. Sia $z'_1 = (1, 2, 3)$ la prima riga della matrice dei dati standardizzati Z . Riportare, arrotondando al **secondo decimale**, la stima del punteggio fattoriale con il *metodo di Bartlett*

$$\hat{f}_1 = (\hat{\Lambda}'\hat{\Psi}^{-1}\hat{\Lambda})^{-1}\hat{\Lambda}'\hat{\Psi}^{-1}z_1 = \dots\dots\dots$$

d. Si spieghi cos'è un caso di Heywood.

```
R=matrix(c(1,.83,.78, .83,1,.67, .78, .67,1), byrow=T,ncol=3)
# a
lambda1 = sqrt( R[1,2]*R[1,3]/R[2,3] )
lambda2 = sqrt( R[1,2]*R[2,3]/R[1,3] )
lambda3 = sqrt( R[1,3]*R[2,3]/R[1,2] )
round(lambda1,2)

## [1] 0.98
round(lambda2,2)

## [1] 0.84
round(lambda3,2)

## [1] 0.79
psi1 = 1-lambda1^2
psi2 = 1-lambda2^2
psi3 = 1-lambda3^2
round(psi1,2)

## [1] 0.03
round(psi2,2)

## [1] 0.29
round(psi3,2)

## [1] 0.5
# c
z1 = matrix(c(1,2,3),ncol=1)
hatLambda = matrix(c(lambda1,lambda2,lambda3),ncol=1)
hatPsi = diag(c(psi1,psi2,psi3))
invPsi = diag(1/c(psi1,psi2,psi3))
```

```
hatf1B = solve(t(hatLambda)%*%invPsi)%*%hatLambda) %*% t(hatLambda) %*% invPsi %*% z1
round(hatf1B,2)
```

```
##      [,1]
## [1,] 1.23
```

Esercizio 3 (8 punti)

Un gruppo di $n = 112$ individui si è sottoposto a $p = 6$ prove di abilità e intelligenza. Caricare la matrice di *varianze/covarianze* `S` `ability.cov` presente nella libreria `datasets` e si risponda alle seguenti domande:

- a. Sulla base della matrice di *correlazione* R , si stimi il modello fattoriale con $k = 2$ fattori utilizzando il metodo della massima verosimiglianza senza effettuare **nessuna rotazione**. Riportare, arrotondando al **terzo decimale** il valore delle statistiche test

$$T = n \log \left(\frac{\det(\hat{\Lambda}\hat{\Lambda}' + \hat{\Psi})}{\det(R)} \right) = \dots \quad T_{Bartlett} = [(n-1) - (2p+4k+5)/6] \log \left(\frac{\det(\hat{\Lambda}\hat{\Lambda}' + \hat{\Psi})}{\det(R)} \right) = \dots$$

```
# a
rm(list=ls())
n = 112
S = ability.cov$cov
D = diag(diag(S)^(-1/2))
R = D %*% S %*% D
af <- factanal(covmat=R, factors=2, n.obs = n, rotation = "none")
Lambda = af$loadings[,]
Psi = diag(af$uniquenesses)
Tstat = n*log(det(Lambda %*% t(Lambda) + Psi )/det(R))
round(Tstat,3)
```

```
## [1] 6.399
```

```
p = ncol(R)
k = 2
Tbart = ( (n-1) - (2*p + 4*k + 5)/6 ) * log(det(Lambda %*% t(Lambda) + Psi )/det(R))
round(Tbart,3)
```

```
## [1] 6.104
```

```
#round(af$STATISTIC,3)
```

- b. Si riportino, arrotondando al **primo decimale**, i seguenti valori

$$\hat{\Lambda}_{p \times k} = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix} \quad \hat{\Lambda}_{p \times k}^* = \hat{\Lambda}_{p \times k} A_{p \times k} = \begin{bmatrix} \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

dove $\hat{\Lambda}_{p \times k}$ è la stima dei pesi fattoriali del modello descritto al punto a. e $A_{2 \times 2} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}$ con $\phi = 0$ è una matrice ortogonale che produce una rotazione oraria dei pesi fattoriali $\hat{\Lambda}$.

```
# b
round(Lambda,1)
```

```
##      Factor1 Factor2
## [1,]      0.6      0.4
```

```
## [2,] 0.3 0.5
## [3,] 0.5 0.7
## [4,] 0.3 0.4
## [5,] 1.0 -0.1
## [6,] 0.8 0.0

phi = 0
A = matrix(c(cos(phi),sin(phi),-sin(phi),cos(phi)), byrow=TRUE, ncol=2)
Lambdastar = Lambda %*% A
round(Lambdastar,1)
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,] 0.6 0.4
## [2,] 0.3 0.5
## [3,] 0.5 0.7
## [4,] 0.3 0.4
## [5,] 1.0 -0.1
## [6,] 0.8 0.0
```

c. Riportare, arrotondando al **terzo decimale**, il p -value

$$\Pr(\chi_{\frac{1}{2}[(p-k)^2-p-k]}^2 > t) = \dots\dots$$

dove t è il valore osservato della statistica test $T_{Bartlett}$ calcolata al punto a.

d. Definire l'ipotesi nulla H_0 e ipotesi alternativa H_1 del test considerato al punto a.

H_0 :

H_1 :

```
# c
# round(af$PVAL,3)
p=6
k=2
df = (1/2)* ( (p-k)^2 -p -k )
round(pchisq(Tbart, df, lower.tail = F),3)
```

```
## [1] 0.192
```

Esercizio 4 (4 punti)

Dimostrare, esplicitando tutti i passaggi e le quantità coinvolte, che

a. se esiste un $c_{p \times 1} \neq 0$ tale che $\tilde{X}' c = 0$, allora $\det(S) = 0$ dove $S = \frac{1}{n} \tilde{X}' \tilde{X}$.

b. nel modello fattoriale a k fattori, $\mathbb{E} \begin{pmatrix} x & f' \end{pmatrix} = \Lambda$