

Esercitazione : Analisi delle Componenti Principali

Esercitatrice: Chiara Gaia Magnani

Example 0.1. 1. Determinare le componenti principali relative alla matrice di varianze e covarianze

$$S = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. Si calcoli la proporzione di varianza spiegata dalla prima componente principale.

Example 0.2. Partendo dalla matrice di varianze e covarianze dell'esercizio precedente, calcolare nella matrice di correlazione R .

1. Determinare le componenti principali a partire da R e la proporzione di varianza spiegata dalla prima componente.

2. Confrontare i risultati con quelli ottenuti nell'esercizio precedente e commentare la risposta.

3. Si calcoli la correlazione tra il k -simo vettore dei punteggi y_k , per $k = 1, 2$, e la j -sima colonna di Z , i.e. z_j , per $j = 1, 2$.

Example 0.3. Si supponga che la matrice dei dati X consista di due colonne x_1 e x_2 tali che $x_2 = 2x_1$. Determinare autovalori e autovettori della matrice di correlazione R di X . Qual è la percentuale di varianza spiegata dalla prima componente principale?

Example 0.4. Supponiamo che alla matrice dei dati X sia associata la matrice di varianze/covarianze $S = \text{diag}(s_{11}, \dots, s_{pp})$ con $s_{11} \geq \dots \geq s_{pp} > 0$. Per questa particolare matrice di varianze/covarianze, ha senso effettuare l'analisi delle componenti principali? E l'analisi delle componenti principali basata sulla corrispondente matrice di correlazione R ? Giustificare le risposte.

Example 0.5. Supponiamo di aver ortogonalizzato i dati attraverso la trasformazione di Mahalanobis, ottenendo così la matrice \tilde{Z} . Ha senso considerare l'analisi delle componenti principali sui dati ortogonalizzati \tilde{Z} ? Giustificare la risposta.

Example 0.6. Si consideri la seguente matrice dei dati

$$X = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -0.5 \\ 0 & -1 \\ -1 & -0.5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Calcolare il vettore dei punteggi y_1 relativo alla prima componente principale basata sulla matrice di varianza/covarianza di X e la corrispondente proporzione di varianza spiegata.

Example 0.7. Alla matrice dei dati standardizzati Z associata la seguente matrice di correlazione:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & r & \cdots & r \\ r & 1 & \cdots & r \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r & r & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

Questa matrice di correlazione descrive p variabili ugualmente correlate. Per $r > 0$, gli autovalori-autovettori di R risultano

$$\lambda_1 = 1 + (p - 1)r, \quad v_1 = (1/\sqrt{p}, \dots, 1/\sqrt{p})'$$

e

$$\lambda_j = 1 - r, \quad v_j = \left(\underbrace{\frac{1}{\sqrt{(j-1)j}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{(j-1)j}}}_{j-1}, \frac{-(j-1)}{\sqrt{(j-1)j}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{p-j} \right)', \quad j = 2, \dots, p$$

Scrivere l'equazione della prima componente principale di Z . i.e. $y_1 = Zv_1$ e calcolare la proporzione di varianza spiegata. Per quali valori di r e p la proporzione di varianza spiegata dalla prima componente principale risulta elevata? Fornire un esempio numerico.

Example 0.8. Si consideri l'analisi delle componenti principali sui dati standardizzati Z con la seguente matrice di correlazione

$$R = \begin{bmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{bmatrix}$$

dove $0 < r < 1$. Si consideri ora una trasformazione di scala: $y_1 = c z_1$ e $y_2 = z_2$ per $c > 0$.

Determinare la matrice di varianze/covarianze di $Y = [y_1 \ y_2]$ e i relativi autovalori.